


<b>Clase</b> Angiospermopsida	<b>Familia</b> VERBENACEAE	<b>Nombres comunes de especies conocidas</b> Cinco negritos, cola de zorro, verbena, lantana, choreque, soterré, mora de caballo, jaral, cuasquita, rabo de gato, teca, melina, sombrero chino, pagoda, dama y duranta	<b>Formas de vida (hábitos y sustratos)</b> Hierbas, bejucos, arbustos y árboles terrestres
----------------------------------	-------------------------------	---	--




◀ *Lantana camara* (cinco negritos). El nombre común de cinco negritos proviene por los frutos redondos y negros, que se encuentran generalmente en grupos. Los frutos son consumidos por aves.



▲ *Lantana camara* (cinco negritos). Especie común en potreros, tóxica para el ganado; se puede usar en medicina popular pero solo para uso externo.



▲ *Lantana camara* (cinco negritos, soterré). Existe una gran cantidad de variedades de esta especie, muy utilizada ornamentalmente y para atraer mariposas.




◀ *Stachytarpheta cayenensis* (rabo de gato). Especie muy utilizada para setos vivos y sobre todo para atraer mariposas y colibríes.

► *Stachytarpheta cayenensis* (rabo de gato). Existen varias especies de rabo de gato, que se pueden diferenciar por sus hojas y por el color de las flores.



**Características generales de la familia**

**Hojas**  
Hojas simples opuestas  
Tallos generalmente cuadrados  
Superficies de las hojas generalmente con pelos  
Margen entero o aserrado



**Inflorescencia**

Inflorescencias en racimos, espigas o cabezuelas.  
Flores bilaterales, con 5 sépalos connados, 2 + 3 pétalos connados, 2 + 2 estambres adnados a los pétalos, ovario súpero con 2 carpelos connados. El fruto es una drupa o está dividido en 4 nuececillas.

**Usos**

Muchas especies utilizadas como ornamentales por sus flores llamativas, que atraen gran cantidad de especies de mariposas. La mayoría de las especies posee frutos que atraen aves.